

Essences admissibles à la subvention pour la **COUPE DES FRÊNES PRIVÉS ATTEINTS PAR L'AGRILE DU FRÊNE**

Essence	Déploiement	Hauteur (m)	Largeur (m)	Croissance	Restriction par rapport aux fils électriques (m)	Ensoleillement	Particularités
Caryer cordiforme (<i>Carya cordiformis</i>)	Grand	25	10	Moyenne	11,5	Mi-ombre et ombre	Production de noix globuleux.
Chêne à gros fruits (<i>Quercus macrocarpa</i>) Chêne bicolor (<i>Quercus bicolor</i>) Chêne des marais (<i>Quercus palustris</i>) Chêne écarlate (<i>Quercus coccinea</i>) Chêne jaune (<i>Quercus muehlenbergii</i>) Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i>) Chêne rouge (<i>Quercus rubra</i>)	Moyen à grand	15 à 30	8 à 25	Lente à rapide	7,5 à 14,5	Soleil et mi-ombre	Production de glands.
Chicot du Canada (<i>Gymnocladus dioica</i>)	Moyen	20	14	Très lente	9	Soleil	Production de gousses une partie de l'hiver.
Épinette blanche (<i>Picea glauca</i>) Épinette noire (<i>Picea mariana</i>) Épinette rouge (<i>Picea rubens</i>)	Moyen à grand	12 à 25	5 à 10	Très lente à moyenne	3 à 8	Soleil et mi-ombre	Feuillage vert à l'année / Production de cônes.
Épinette du Colorado (<i>Picea pungens</i>)	Moyen à grand	20	8	Lente	5,5	Soleil et mi-ombre	Feuillage vert à l'année / Production de cônes.
Érable à sucre (<i>Acer saccharum</i>)	Grand	24	24	Très rapide	13,5	Soleil, mi-ombre et ombre	Eau d'érable / Feuillage jaune orangé à rouge à l'automne.
Érable freemanii (<i>Acer x freemanii</i>)	Moyen	16	12	Rapide	10 à 14	Soleil	Feuillage orange rouge à l'automne.
Érable rouge (<i>Acer rubrum</i>)	Moyen	12 à 20	3 à 15	Lente	5 à 10	Soleil et mi-ombre	Feuillage rouge vif à orangé à l'automne.
Févier d'Amérique (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	Moyenne	10 à 18	9 à 16	Moyenne à rapide	Aucune à 11,5	Soleil	Production de gousses / Crée une ombre très légère.
Ginkgo (<i>Ginkgo biloba</i>)	Moyen	20	8	Lente	7,5	Soleil et mi-ombre	Feuillage jaune doré à l'automne.
Hêtre à grandes feuilles (<i>Fagus grandifolia</i>)	Grand	22m	18m	Lente	11	Soleil, mi-ombre et ombre	Feuillage vert foncé qui peut survivre en hiver et devenir brun / Écorce grise / Production de noix (graine comestible).
Marronnier blanc (<i>Aesculus hippocastanum</i>) Marronnier à fleurs rouges (<i>Aesculus Carnea</i>)	Moyen à grand	16	12	Moyenne	8	Soleil et mi-ombre	Feuillage orange rouge à l'automne.
Mélèze d'Europe (<i>Larix decidua</i>) Mélèze Laricin (<i>Larix Laricina</i>)	Moyen à grand	10 à 20	1,5 à 10	Moyenne à rapide	4 à 7	Soleil et mi-ombre	Feuillage jaune vif à l'automne suivi de la perte des aiguilles.
Micocoulier occidental (<i>Celtis occidentalis</i>)	Moyen	15	8	Moyenne à rapide	5,5	Soleil et mi-ombre	Production de drupes foncées aimées des oiseaux.
Noyer cendré (<i>Juglans cinerea</i>)	Grand	18m	12m	Rapide	10	Soleil	Espèce vulnérable / Production de noix comestibles.
Orme d'Amérique (<i>Ulmus americana</i>) Princeton	Grand	25	20	Rapide	11,5	Soleil	Feuillage vert foncé qui peut survivre en hiver et devenir brun / Écorce grise / Production de noix (graine comestible).

Essence	Déploiement	Hauteur (m)	Largeur (m)	Croissance	Restriction par rapport aux fils électriques (m)	Ensoleillement	Particularités
Orme (<i>Ulmus</i>) Homestead, Accolade, Resista, Triumph ou Frontier	Moyen	17 à 18	12 à 14	Rapide	5 à 8	Soleil et mi-ombre	Résistant à la maladie hollandaise.
Orme de Sibérie (<i>Ulmus pumila</i>)	Moyen	18	10	Très rapide	8	Soleil et mi-ombre	Résistant à la maladie hollandaise.
Ostryer de Virginie (<i>Ostrya virginiana</i>)	Moyen	12m	8m	Lente	5	Mi-ombre et ombre	Production de chatons / Reconnu comme étant un arbre produisant le bois le plus dur au Canada.
Pin blanc (<i>Pinus strobus</i>) Pin blanc de l'Ouest (<i>Pinus flexilis</i> ou <i>pinus reflexa</i>) Pin gris (<i>Pinus banksiana</i>) Pin rigide (<i>Pinus rigida</i>) Pin rouge (<i>Pinus resinosa</i>) Pin sylvestre (<i>Pinus sylvestris</i>)	Moyen à grand	10 à 24	4 à 12	Rapide	4 à 9	Soleil et mi-ombre	Feuillage vert à l'année, production de cônes.
Pruche du Canada (<i>Tsuga canadensis</i>)	Grand	20	12	Moyenne	6.5	Mi-ombre et ombre	Feuillage vert à l'année / Production de cônes.
Sapin baumier (<i>Abies balsamea</i>)	Grand	20	5	Lente	5	Soleil et mi-ombre	Feuillage vert à l'année, production de cônes.
Saule noir (<i>Salix nigra</i>)	Grand	25	20	Rapide	11.5	Soleil	Idéal en bande riveraine.
Tilleul d'Amérique (<i>Tilia americana</i>)	Grand	23	17	Rapide	7,5 à 11	Soleil et mi-ombre	Fleurs jaunâtres très parfumées.
Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i>)	Moyen	15	10	Moyenne	5,5 à 8	Soleil	Fleurs jaunâtres très parfumées.

Dernière mise à jour : janvier 2022